

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по применению лекарственного препарата  
**ЙОДОВИДОН**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Йодовидон

**Международное непатентованное название (МНН)  
или группировочное название:** Повидон-йод

**Лекарственная форма:** суппозитории вагинальные

**Состав на один суппозиторий:**

Повидон-йода (йодовидона) – 0,20 г  
(с содержанием не менее 10 %  
свободного йода в пересчете  
на сухое вещество)

**Вспомогательных веществ:**

макрогола 400 (полиэтиленоксида 400) – 0,17 г  
макрогола 4000 (полиэтиленоксида 4000) – 0,28 г  
макрогола 1500 (полиэтиленоксида 1500) – достаточное количество  
для получения суппозитория  
массой 2,25 г

**Описание:** суппозитории от светло-коричневого до темно-коричневого с буроватым оттенком цвета, со специфическим запахом, торпедообразной формы. Допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

**Фармакологическая группа:** антисептическое средство.

**Код АТХ:** G01AX11

**Фармакологические свойства**

Антисептический препарат. Обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении бактерий, в т. ч. кишечной палочки, золотистого стафилококка, грибов, вирусов, простейших.

Активное вещество препарата – йод, находится в виде комплекса с поливинилпирролидоном. Препарат относится к йодоформам, которые связывают йод. При контакте с кожей и слизистыми йод постепенно и равномерно высвобождается.

### **Фармакокинетика**

Нет данных о системной абсорбции.

### **Показания к применению**

Острые и хронические инфекционные воспалительные заболевания влагалища (смешанные, неспецифические инфекции), в том числе инфекции влагалища, вызываемые трихомонадами и грибами; предоперационная профилактика осложнений инфекционного генеза в гинекологии.

### **Противопоказания**

Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату, гипертиреоз, дерматит Дюринга, аденома щитовидной железы, почечная недостаточность, одновременная терапия радиоактивным йодом, детский возраст, I триместр беременности, период лактации.

С осторожностью: II и III триместры беременности, хроническая почечная недостаточность.

### **Способ применения и дозы**

Препарат применяют интравагинально. Предварительно освободив суппозиторий от контурной упаковки, его вводят, лежа на спине, глубоко во влагалище. При подострых и хронических вагинитах – перед сном, в течение 14 дней по 1 суппозиторию (независимо от фазы менструального цикла). При острых вагинитах – по 1 суппозиторию 2 раза в день в течение 7 дней. Для предоперационной профилактики осложнений инфекционного генеза в гинекологии препарат вводят интравагинально 2 раза в сутки (утром и вечером перед сном) в течение 1 – 7 дней.

### **Побочное действие**

Зуд, гиперемия на местах аппликации; аллергические реакции.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не следует применять препарат в комплексе с другими антисептическими средствами, содержащими ртуть, окислители, щелочи и катионные поверхностно-активные вещества. В присутствии крови бактерицидное действие препарата может уменьшиться.

### **Особые указания**

В случае неманифестного гипертиреоза и других заболеваний щитовидной железы (особенно у пожилых больных) препарат применяется только

по строгим показаниям и под постоянным врачебным контролем. Избегать попадания в глаза.

**Форма выпуска**

Суппозитории вагинальные 200 мг по 5 суппозиториям в контурной ячейковой упаковке. Две контурные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать после срока, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель/организация, принимающая претензии**

ЗАО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Телефон: (3854) 326-943, 326-946

Факс: (3854) 327-153, 327-640

И.о. директора ИДКЭЛС

А.Н. Васильев

Генеральный директор  
ЗАО «Алтайвитамины»,  
доктор фарм. наук

Ю.А. Кошелев