

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ОКСОЛИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Оксолин.

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин.

Лекарственная форма: мазь назальная.

Состав:

Действующее вещество:

диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин) – 0,25 г.

Вспомогательные вещества:

вазелиновое масло (парафин жидкий) – 0,50 г

вазелин – до 100 г.

Описание

Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусное средство для местного применения.

Код АТХ J05AX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса.

Фармакокинетика

При нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20 % препарата. В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Показания к применению

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к диоксотетрагидрокситетрагидронафталину и другим компонентам препарата.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до двух лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Местно.

Для профилактики гриппа: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку носа 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея. В редких случаях возможно синее окрашивание слизистой оболочки носа.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Мазь назальная 0,25 %.

По 10 г в тубу алюминиевую. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше + 10 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года.

Не использовать позже срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/ производитель/ организация, принимающая претензии потребителей

АО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Телефон: (3854) 338-719, 326-948

Факс (3854) 326-943

Генеральный директор

АО «Алтайвитамины»

Кошелев Ю.А.