

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Бензилбензоат.

**Международное непатентованное или группировочное наименование**  
Бензилбензоат.

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения.

**Состав мази на 100 г**

Действующее вещество:

бензилбензоат	20,0 г
---------------	--------

Вспомогательные вещества:

Триэтаноламин термостабильный (троламин)	5,0 г
--	-------

стеариновая кислота	20,0 г
---------------------	--------

макрогол 400	5,0 г
--------------	-------

вода очищенная	до 100 г
----------------	----------

**Описание**

Мазь белого или желтовато-белого цвета со специфическим запахом.

Допускается наличие пузырьков воздуха.

**Фармакотерапевтическая группа**

Противочесоточное средство.

**Код АТХ:** P03AX01.

**Фармакологические свойства**

Противочесоточный препарат для наружного применения.

Оказывает токсическое действие в отношении чесоточного клеща. Вызывает гибель личинок и взрослых особей чесоточных клещей, гибель наступает

через 7-32 мин. Проходит хитиновый покров и накапливается в организме клеща в токсических концентрациях, не действует на их яйца.

### **Фармакокинетика**

Проникает в верхние слои эпидермиса, не всасывается в системный кровоток.

### **Показания к применению**

Чесотка.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к бензилбензоату и другим компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение мази противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Наружно. Для лечения взрослых применяют 20 % мазь.

Курс лечения продолжается 4 дня. В первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья под душем теплой водой с мылом. Мазь наносят на весь кожный покров, исключая лицо и волосистую часть головы, втирают руками, которые не моют до утра. На одно применение расходуется 30-40 г мази. На второй и третий день делают перерыв в лечении, при этом остатки мази с кожи не смывают. На четвертый день вечером больной моется с мылом и проводит втирание мази точно так же, как в первый день, используя оставшуюся мазь, и еще раз меняет белье. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 часов, в последующем их обрабатывают мазью после каждого мытья. В случае смывания мази с других участков кожи их нужно также повторно обработать. Мазь полностью смывают с кожи на пятый день лечения.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

### **Побочное действие**

Местные реакции: возможно ощущение жжения, раздражение кожи, аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

### **Передозировка**

Не выявлено.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Фармакологического взаимодействия мази с другими препаратами не выявлено. Бензилбензоат не рекомендуется применять одновременно с другими наружными лекарственными средствами.

### **Особые указания**

Перед началом лечения больному целесообразно принять горячий душ для механического удаления с поверхности кожи клещей, а также разрыхления поверхностного слоя эпидермиса (для облегчения проникновения препарата). После каждого вынужденного мытья рук необходимо их обработать мазью вновь.

Лечение больных, выявленных в одном очаге, а также контактных лиц должно проводиться одновременно во избежание повторного заражения. Сохранение зуда после лечения не является показанием для назначения дополнительного курса специфической терапии. Зуд является реакцией организма на убитого клеща и продукты его жизнедеятельности. Он исчезает при назначении антигистаминных препаратов и мазей с

глюкокортикостероидами. После лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель, а при наличии осложнений и более длительное время.

Все предметы, которые соприкасались с зараженной кожей, должны быть подвергнуты тщательной обработке. Постельные принадлежности, белье, полотенца кипятят в растворе стирального порошка в течение 5-10 минут. Верхнюю одежду проглаживают с обеих сторон горячим утюгом. Вещи, не подлежащие термической обработке, вывешиваются на открытый воздух на 3 дня. Обувь, игрушки и прочие предметы исключают из пользования на 5 дней и помещают в целлофановый пакет. Матрацы, подушки, одеяла также исключаются из пользования на 5 дней или подвергаются камерной дезинфекции. Мягкую мебель можно обрабатывать препаратами для дезинсекции. В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или добавлением дезинфицирующих средств.

Избегать попадания препарата в глаза, полость носа и полость рта.

При попадании препарата в:

- полость носа – полость носа обильно промыть водой;
- полость рта – полость рта обильно прополоскать водой или 2%-ным теплым раствором натрия гидрокарбоната (питьевой соды);
- желудок – желудок промыть 1-2%-ным раствором натрия гидрокарбоната, водной смесью жженой магнезии и активированного угля (по 1-2 столовые ложки на стакан воды);
- глаза – глаза тщательно промыть водой или 1-2%-ным раствором натрия гидрокарбоната.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

### **Форма выпуска**

Мазь для наружного применения 20 %.

По 25 г или 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/производитель/организация,  
принимаящая претензии потребителей:**

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Тел.: (3854) 326-948, 338-719; факс (3854) 326-943

Генеральный директор  
АО «Алтайвитамины»

Кошелев Ю.А.