

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**КАМЕТОН**

*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.*

*Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.*

*Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

*Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

**Регистрационный номер**

**Торговое наименование:** Каметон

**Группировочное наименование:**

Камфора+Хлоробутанол+Эвкалипта шарикового листьев масло+[Левоментол]

**Лекарственная форма:** спрей для местного применения

**Состав:** **15 г** **30 г**

Действующие вещества:

Хлоробутанола гемигидрат 0,15 г 0,3 г

Камфора рацемическая 0,15 г 0,3 г

Левоментол 0,15 г 0,3 г

Эвкалиптовое масло 0,15 г 0,3 г

Вспомогательные вещества:

Этанол (спирт этиловый 95 %) 0,6 г 1,2 г

Изопропилмиристат 13,8 г 27,6 г

**Описание**

Содержимое баллона – маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом, образующая при выходе из баллона конус диспергированных в воздухе частиц жидкости.

**Код АТС:** R02AA20

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептическое средство.

### **Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат, оказывает местное антисептическое, противовоспалительное и легкое местноанестезирующее действие, способствует сужению сосудов, а также уменьшению кровенаполнения и отека пораженного участка, уменьшает симптомы раздражения слизистой оболочки глотки и гортани, способствует нормализации дыхания больных. Препарат оказывает противомикробное действие в отношении грамположительных (стафилококки, стрептококки) и грамотрицательных (кишечная палочка, синегнойная палочка) бактерий и в меньшей степени в отношении дрожжеподобных грибов рода *Candida*. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

### **Показания к применению**

Воспалительные заболевания ЛОР-органов (в т.ч. ринит, фарингит, ларингит).

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность. Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Детский возраст до 5 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Противопоказания к применению препарата у женщин в состоянии беременности и женщин, кормящих грудью, не выявлены.

### **Способ применения и дозы**

Местно.

Распыляют в ротовую полость (вправо и влево) и носовые ходы (предварительно очистив их от слизи, слегка наклонив голову вперед, в каждую ноздрю, на фазе вдоха).

Взрослым и детям старше 15 лет – по 1-3 распыления.

Дети в возрасте от 12 до 15 лет – по 1-2 распыления.

Дети от 5 до 12 лет – по 1 распылению.

Частота применения – 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 7-10 дней.

При первом использовании препарата или перерыве в его использовании более 1 суток следует произвести несколько нажатий до появления дисперсной струи, после чего препарат можно применять.

При применении препарата баллон держать вертикально, распылителем кверху; нельзя пользоваться баллоном в перевернутом состоянии.

Если через указанный курс лечения (7-10 дней) улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции в виде сыпи, зуда и покраснения кожи.

В случае проявления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

### **Передозировка**

Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу.

Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов – активированного угля), симптоматическое лечение.

### **Взаимодействие с другими препаратами**

Клинически значимого взаимодействия препарата с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

### **Особые указания**

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска**

Спрей для местного применения.

По 15 г или 30 г в баллоны аэрозольные алюминиевые, снабженные механическим насосом, распылительной насадкой и предохранительным колпачком. Каждый баллон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

**Условия хранения**

При температуре от 0 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:**

АО «Алтайвитамины»

659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Тел.: (3854) 326-948, 338-719

Факс (3854) 326-943

Генеральный директор  
АО «Алтайвитамины»

Ю.А.Кошелев