

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

АСКОРУТИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Аскорутин

Группировочное наименование: Аскорбиновая кислота + Рутозид (Ascorbic acid + rutoside)

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку:

Действующие вещества:

Аскорбиновая кислота (витамин С) – 50 мг

Рутозид (Рутин) – 50 мг

Вспомогательные вещества: - до 330 мг

Сахароза (сахар белый) - 152,1 мг

Крахмал картофельный - 68,6 мг

Тальк - 6,4 мг

Кальция стеарат – 2,9 мг

Описание

Таблетки от желтого до желтого с зеленоватым оттенком цвета с незначительными вкраплениями от зеленого до коричневого цвета, плоскоцилиндрической формы с риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа: витамин

Код АТХ: [C05CA51]

Фармакологические свойства

Аскорбиновая кислота участвует в регуляции окислительно-восстановительных реакций, углеводного обмена, синтезе коллагена.

Рутозид устраняет повышенную проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку.

Показания к применению

Гипо- и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида.

В составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов: при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности, геморрагическом диатезе.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст, беременность (I триместр).

С осторожностью

Состояния, сопровождающиеся гиперкоагуляцией крови и склонностью к тромбозам, тромбофлебит.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день во время или после приема пищи. Курс лечения - 2-3 нед.

Побочное действие

Аллергические реакции, диспепсические расстройства, головная боль.

Передозировка

Применение чрезмерных доз препарата может вызвать тошноту, рвоту, понос, головную боль.

Лечение: симптоматическое, форсированный диурез.

Взаимодействие

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных средств группы пенициллина, железа; снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.

Особые указания

При беременности (II и III триместр) и в период лактации применяют, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Не оказывает влияния на способность к управлению автотранспортным средством и занятиям любыми потенциально опасными видами деятельности.

Форма выпуска

Таблетки, 50 мг + 50 мг.

По 10 или 50 таблеток в контурные ячейковые упаковки.

5 контурных упаковок по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению или 1 контурная упаковка по 50 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Контурные упаковки по 50 таблеток вместе с инструкцией по применению (по числу упаковок) помещают в групповую упаковку (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:

АО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

тел.: (3854) 338-719, 326-948

факс (3854) 326-943

Генеральный директор
АО «Алтайвитамины»,
доктор фарм. наук

Ю.А Кошелев