

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## ПРОПОСОЛ

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:**

Пропосол.

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Прополис.

**Лекарственная форма:** спрей для местного применения.

**Состав (на 1 баллон):** 25 г 50 г

Действующее вещество:

прополис - 1,5 г или 3,0 г

Вспомогательные вещества:

этанол (спирт этиловый) 95 % - 20,0 г или 40,0 г

глицерол (глицерин) - 3,5 г или 7,0 г

### **Описание**

Жидкость от зеленовато-желтого до коричневого цвета, с характерным запахом прополиса.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Регенерации тканей стимулятор природного происхождения.

**Код АТХ:** А01АD11

### **Фармакологические свойства**

Препарат природного происхождения на основе продукта жизнедеятельности пчел – прополиса. Обладает противовоспалительным, противомикробным, болеутоляющим свойствами, стимулирует процессы регенерации.

### **Показания к применению**

Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта: катаральный гингивит и стоматит, афтозный и язвенный стоматит, пародонтит.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и продуктам пчеловодства, экзема, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием клинических данных).

## **С осторожностью**

Заболевания печени, алкоголизм, заболевания головного мозга, черепно-мозговая травма, эпилепсия.

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется (в связи с отсутствием клинических данных).

## **Способ применения и дозы**

*Местно.* Перед применением снимают с баллона предохранительный колпачок и на шток клапана надевают распылительную насадку, нажимают несколько раз для того, чтобы раствор поступил в насадку. После выхода раствора из насадки наконечник направляют в полость рта и нажимают на нее 3-4 раза, равномерно орошают воспаленную область. Длительность распыления – до 2 секунд. В остром периоде воспалительного процесса орошение производят 2-3 раза в день, при уменьшении воспалительного процесса – 1-2 раза в день до полного выздоровления (обычно в течение 3-7 дней).

После орошения ротовой полости желательно не употреблять пищу в течение 15-30 мин.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

## **Побочное действие**

Кратковременное жжение в месте нанесения препарата, аллергические реакции, покраснение кожных покровов, зуд кожи, ангионевротический отек.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

При возможной передозировке препарата возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. В этом случае применение препарата следует прекратить.

Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не описано.

Если Вы применяете лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Пропосол проконсультируйтесь с врачом.

### **Особые указания**

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,28 г, в максимальной суточной дозе – 0,84 г.

Перед применением препарата рекомендуется прополоскать ротовую полость теплой кипяченой водой.

Упаковку следует предохранять от ударов, падений, прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание препарата в глаза.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.**

Препарат содержит этиловый спирт, поэтому в период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

### **Форма выпуска**

Спрей для местного применения.

По 25 г или 50 г в баллоны аэрозольные алюминиевые, снабженные механическим насосом, распылительной насадкой и предохранительным колпачком.

Каждый баллон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается полный текст инструкции выносить на пачку без вложения инструкции.

#### **Условия хранения**

Хранить при температуре не ниже 0 °С и не выше 35 °С.

Хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников огня.

#### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:**

АО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69

Тел.: (3854) 326-948, 338-719

Факс (3854) 326-943

Генеральный директор

Кошелев Ю.А.

АО «Алтайвитамины»